




DMPA නික්ෂේපනයක් AD (Auto Disable) සිරිත්පරයකින් නිවැරදිව සේවාවලාභියෙකුට ලබා දෙන අයුරු




1. DMPA කුප්පියේ අඩියේ මිදී ඇති අවක්ෂේපය සම්පූර්ණයෙන් දිය වන තුරු තදින් සොලවන්න. කුප්පියේ අඩියේ සුදු පැහැති කුඩක් ඉතිරි නොවිය යුතුයි.
2. DMPA එන්නත සඳහාම 1ml AD සිරිත්පරයක් පවුල් සෞඛ්‍ය කාර්යාංශය මගින් සපයනු ලැබේ. DMPA නික්ෂේපණ සඳහා එම සිරිත්පර පමණක් භාවිතා කරන්න.
3. AD සිරිත්පරය කවරයෙන් ඉවතට ගන්න.

සැලකිය යුතුයි:

- ⊕ පිස්ටනය එන්නත් කටුව දෙසට තල්ලු කිරීමෙන් වලකින්න.
- ⊕ එසේ කල හොත් සිරිත්පරය ලොක් වනු ඇත.




1
 DMPA එන්නත පුරවා ගැනීමට පෙර පිස්ටනය ඉදිරියට තල්ලු කිරීමෙන් වලකින්න



2
 එන්නත් කටුව DMPA කුප්පියේ රබර් පියන තුලට ඇතුළත් කර පිස්ටනය හැකි තාක් පිටුපසට අදින්න



3
 කුප්පියේ ඇති ද්‍රාවණය සියල්ලම සිරිත්පරයට පුරවා ගන්න



4
 වායු බුබුළු නැති වන සේ DMPA සහිත සිරිත්පරය 1ml දක්වා සකසා ගන්න

එන්නත ලබා දීමේදී:

1. සේවාවලාභියා සුව පහසු ලෙස අසුන් ගත්වන්න.
2. සේවාවලාභියාගේ නුහුරු අතේ බාහුවේ උඩ කොටස හොඳින් නිරාවරණය වන සේ ඇඳුම සකසා ගැනීමට උපදෙස් දෙන්න
3. එන්නත් කටුව අංශක 90ක කෝණයකින් සම්පූර්ණයෙන්ම මාංශ පේශිය තුලට ඇතුළත් කරන්න.
4. තත්පර 5-7 කාලයක් තුලදී සෙමින් DMPA ද්‍රාවණය සම්පූර්ණ ප්‍රමාණයම මාංශ පේශිය තුළට ලබා දෙන්න
5. විනාඩි 20 -30 පමණ සේවාවලාභියා නිරීක්ෂණය කරන්න.